

# 桂林雁山园林植物害虫名录初报

黎天山

(广西植物研究所)

随着我国社会主义物质文明和精神文明建设的发展和人民物质文化生活水平的提高,园林、观赏植物在城市、工矿区乃至农村都日益受到重视。出现了欣欣向荣的景象。栽培园林、观赏植物不仅能美化环境,而且还可以改善环境。园林、观赏植物的种类是多种多样的,充分利用城市房子的周围环境中屋顶、阳台、建筑物外壁、天井、窗台等特殊条件,是很好的绿化场地。可是,由于园林、观赏植物种类繁多,性质各异,给各种病虫提供了良好的生活条件。加上我区地处亚热带,气候温和,雨量充沛。因而,园林植物在病虫害防治方面,问题比一般农作物复杂得多,而这方面的研究却远远不如农作物。正由于园林、观赏植物的病虫害种类多,生长繁殖快,为害时间长,轻的有损观赏价值,重的威胁植株生命,直接影响改善环境方面的作用。造成不可估量的损失。

近年来我们常收到园林、观赏植物爱好者来信,询问有关园林、观赏植物病虫害种类和防治方法的问题。这就说明了群众迫切需要了解园林病虫害的有关知识。为了有利于生产,满足爱好者的需要。作者将多年来在桂林雁山等地在园林植物方面所收集到的标本,初步整理出8目58科225种园林植物害虫名录,现报道如下:

## 一、直翅目 Orthoptera

### (一) 螞蟥科 Tettigoniidae

#### 1、日本宽翅螞蟥 *Holochlora japonica* (Branner von wattenwyl) *japanese broadwinged Katydid*

寄主及为害期:樟树、桃树、罗汉果。5—9月份。

分布:龙胜、桂林、永福、金秀、龙州、大青山。

#### 2、内产螞蟥 *Elimaea* sp.

寄主及为害期:菊科植物及罗汉果。5—9月。

分布:桂林雁山。

#### 3、纺织娘 *Mecopoda elongata* (Linnaeus)

寄主及为害期:无花果、桃、梨、桑、茶、柑桔。4—11月。

分布:桂林雁山、永福、金秀、桂平。

1988年1月4日收稿

本文承蒙广西科学院生物研究所尤其做研究员申国文稿;本所前所长梁畴芬研究员、前书记李晚南付研究员,对此项工作的热情支持;标本由中国科学院动物研究所朱弘复、李传隆、张广学、薛大勇等先生及上海昆虫研究所夏凯游教授鉴定,在此一并致谢。

△标本承蒙中国科学院研究所朱弘复教授鉴定,在此表示感谢。

4、光绿蠹蛾 *Sympaestria truncatolobata* von Walttemwyl

寄主及为害期: 桃树、樟树。6—12月。

分布: 桂林雁山、金秀。

5、绿蠹蛾 *Sympaestria* sp.

寄主及为害期: 桃树、樟树、美人蕉、玫瑰。6—12月。

分布: 桂林雁山。

(二) 蟋蟀科 *Gryllidae*6、梨桔蛉 *Madassumma hibinonis* matsumura

寄主及为害期: 梨、罗汉果。5—8月。

分布: 桂林雁山。

7、华南大蟋蟀 *Brachytrupes portentosus* Lichtenstein

寄主及为害期: 棕榈、柑桔、泡桐、罗汉果。4—10月。

分布: 广西各地。

8、蟋蟀 *Scapsipedus micado* Saussere

寄主及为害期: 泡桐、猕猴桃、罗汉果。3—10月。

分布: 桂林雁山、金秀。

9、丑蟀 *Loxoblemmua doenitzi* Stein

寄主及为害期: 泡桐、猕猴桃、樟、菊花。3—10月。

分布: 桂林雁山、龙胜。

10、黄褐油葫芦 *Gryllus testaceus* Walker

寄主及为害期: 泡桐、猕猴桃、刺槐、罗汉果。3—10月。

分布: 广西各地。

11、中华油葫芦 *Gryllus chinensis* web.

寄主及为害期: 菊花、泡桐、猕猴桃。3—10月。

分布: 广西各地。

(三) 蝼蛄科 *Gryllotalpidae*12、非洲蝼蛄 *Gryllotalpa africana* palisot

寄主及为害期: 棕榈、泡桐、猕猴桃、银杏、罗汉果。3—10月。

分布: 广西各地。

(四) 短角蝗科 *Eumastacidae*13、变色乌蝗 *Eriantlus versicolor* ( Br. -w. )

寄主及为害期: 芭蕉、美人蕉、猕猴桃、黄牛木、蕃石榴、紫苏。5—9月。

分布: 桂林雁山、全州、龙胜、阳朔、荔浦、平乐、鹿寨、金秀、宾阳、贵县、平南、容县、岑溪、罗城、都安、灵山、浦北、扶绥、崇左、武鸣、龙州。

(五) 锥头蝗科 *pyrgomorphidae*14、短额负蝗 *Atractomorpha sinensis* Bol.

寄主及为害期: 桂花、美人蕉、猕猴桃、野菊、红桑、乌柏、泡桐、梧桐、莽苳、首乌。3—12月。

分布: 广西各地。

15、纺梭负蝗 *Atractomorpha burri* I. bol.

寄主及为害期: 一串红、菊花、美人蕉、, 3—12月,

分布: 桂林雁山、灵川、临桂、永福、金秀、南宁、桂平、龙州、凭祥。

#### (六) 斑腿蝗科 *Catantopidae*

16、斑角蔗蝗 *Hieroglyphus armulicornis* (Shir.)

寄主及为害期: 金竹、蒲葵、勒竹。5—9月。

分布: 桂林雁山、龙胜、桂平、容县、龙州、凭祥、灌阳、柳州、柳江、北海。

17、中华稻蝗 *Oxya chinensis* (Thunb.)

寄主及为害期: 棕榈、芭蕉、竹子。5—10月。

分布: 桂林雁山、龙胜、桂平、容县、龙州、凭祥。

18、小稻蝗 *Oxya hyla intricata* (stal).

寄主及为害期: 台湾草、蒲葵、芭蕉、象草。5—11月。

分布: 桂林雁山、龙胜、灵川、临桂、永福、柳江、柳州、武宣、容县、钦州、灌阳。

19、中华越北蝗 *Tonkiacris Sinensis* Chang

寄主及为害期: 绣球花、阔叶十大功劳、千里光、刺桐、臭牡丹。5—9月。

分布: 桂林雁山、兴安、龙胜、阳朔、金秀。

20、短角外斑腿蝗 *Xenocatantops humilis brachycerus* (Willemse)

寄主及为害期: 金花茶、猕猴桃、艾、葛藤、红背山麻杆、三叶五加。6—9月。

分布: 全州、兴安、灌阳、资源、龙胜、灵川、桂林雁山、临桂、永福、阳朔、荔浦、金秀、象州、平南、桂平、博白、钦州、容县、柳州、柳江、武宣、南宁、宁明、龙州。

21、棉蝗 *Chondracris rosea rosea* (De Geer)

寄主及为害期: 木麻黄、枳椇、算盘子、白背悬钩子。5—11月。

分布: 广西各地。

22、南方十字蝗 *Epistaurus meridionalis* Bi

寄主及为害期: 燕子尾、三叶五加。5—9月。

分布: 桂林雁山、柳州、桂平、博白、容县、钦州、龙州、凭祥。

23、异角胸斑蝗 *Apalacriss varicornis* walker

寄主及为害期: 搜山虎、葛藤。5—9月。

分布: 桂林雁山、龙胜、柳江、柳州、桂平、武宣。

#### (七) 斑翅蝗科 *Oedipodidae*

24、东亚飞蝗 *Locusta migratoria manilensis* (Meyon)

寄主及为害期: 台湾草。5—10月。

分布: 桂林雁山、百色、都安、柳城、柳江、来宾、武宣、贵县、邕宁、北海。

#### (八) 蝗科 *Acrididae*

25、大青脊竹蝗 *Ceracris nigricornis laeta* (I. Bol.)

寄主及为害期: 金竹、楠竹、蒲竹、篙竹、吊丝竹。5—9月。

分布: 桂林雁山、兴安、资源、龙胜、三江、融水、融安、临桂、永福、柳州、龙州、宁明、凭祥。

26、黄脊竹蝗 *Ceracris kiangsu* Tsai

寄主及为害期: 金竹、蒲竹、青皮竹。5—9月。

分布: 桂林雁山、兴安、资源、龙胜、灵川、临桂、永福、阳朔、荔浦、平乐、金秀、鹿寨、融安、

三江、象州、忻城、岑溪、浦北、武鸣。

27、贺氏竹蝗 *Ceracris hoffmanni* uvarov

寄主及为害期:小竹类。5—10月。

分布:桂林雁山、金秀、柳州、桂平、钦州、龙州。

28、中华剑角蝗 *Acrida chinensis* (Westwood)

寄主及为害期:木芙蓉、茶树。5—10月。

分布:桂林雁山、兴安、资源、龙胜、灵川、临桂、永福、阳朔、鹿寨、柳江、柳州、武宣、金秀、象州、平南、桂平、贵县、博白、钦州、南宁、武鸣、崇左、宁明、龙州、凭祥。

## 二、等翅目 Isoptera

### (九)白蚁科 Termitidae

29、黑翅土白蚁 *Odontotermes formosanus* (Shiraki)

寄主及为害期:樟树、木麻黄、竹材、松、杉、合欢、广玉兰、桂花、柏树、檫树、木荷等。蛀害树皮及树干枯死部分。全年均可受害。

分布:桂林雁山、全州、柳州、宜山、河池、苍梧、玉林、钦州、合浦、南宁、北海、龙州。

30、黄翅大白蚁 *Macrotermes barneyi* Light

寄主及为害期:桂花、水松、泡桐、樟树、杉、桉、松、枫杨、油桐、板栗、刺槐、檫树。蛀害触及地面的枝干、枯竹、竹材等。全年均可受害。

分布:桂林雁山、三江、柳城、柳州、河池、宜山、来宾、苍梧、平南、贵县、玉林、博白、浦北、合浦、南宁、武鸣、龙州、百色、巴马、天峨。

31、长头大白蚁 *Macrotermes longiceps* Li et ping

寄主及为害期:枇杷、泡桐、罗汉果。蛀害枯腐倒木及薯块。全年均可受害。

分布:桂林雁山。

### (十)鼻白蚁科 Rhinotermitidae

32、家白蚁 *Coptermes formosanus* Shiraki

寄主及为害期:柑桔、板栗、柏、槐树、合欢、臭椿、银杏、桑、棕榈、梧桐、桉属、竹等木竹、木材加工品以及活树的已死部分。全年均可受害。

分布:广西各地。

## 三、同翅目 Homoptera

### (十一)蝥蟥蝉科 Flatidae

33、碧蝥蟥蝉 *Geisha distinctissima* Walker

寄主及为害期:女贞、樟树、乌柏、柑桔、罗汉果。5—7月。

分布:桂林雁山、博白。

34、玉翅蝥蟥蝉 *Lawana imitata* Melicher

寄主及为害期:相思树、桃、梨、柑桔、柿、李。5—7月。

分布:桂林雁山。

(十二) 长头蜡蝉科 *Dictyophoridae*35、中野象蜡蝉 *Dictyophora nakanonis* Matsumura

寄主及为害期: 猕猴桃, 5—7月。

分布: 桂林雁山、临桂、永福。

(十三) 广翅蜡蝉科 *Ricanidae*36、八点广翅蜡蝉 *Ricania speculom* Walker

寄主及为害期: 白玉兰、黄檀、紫薇、香椿、柚、柑桔、桑、梨、樟、酸枣, 7—8月。

分布: 桂林雁山、全州、灌阳、兴安、龙胜、灵川、永福、阳朔、荔浦、平乐、融安、融水、三江、柳江、来宾、横县、平南、梧州、陆川、博白、南宁、马山、南丹、巴马、乐业、隆林。

37、眼纹广翅蜡蝉 *Euricania ocellus* Walker

寄主及为害期: 小叶女贞、泡桐、白背野桐、罗汉果、刺槐、茶树, 7—8月。

分布: 桂林雁山、灵川、荔浦、平乐、三江、融水、罗城、柳州、南宁、龙州、凭祥。

(十四) 蝉科 *Cicadidae*38、黑蚱蝉 *Cryptotympana atrata* Fabricius

寄主及为害期: 桂花、女贞、竹、苦楝、水杉、柑桔, 6—8月。

分布: 广西各地。

(十五) 绵蚧科 *Margarodae*39、吹绵蚧 *Icerya purchasi* Maskell

寄主及为害期: 女贞、海桐、樟木、金桔、柚、橙, 3—12月。

(十六) 盾蚧科 *Diaspididae*40、考氏白盾蚧 *Pseudaulacaspis cockerelli* (Cooley)

寄主及为害期: 白兰、黄兰、荷花玉兰、苏铁、石栗、桂花、含笑、兰花、山茶、夜合、万年青、杜鹃、夹竹桃, 2—11月。

分布: 桂林雁山。

41、黄片盾蚧 *Parlatoria proteus* (Curtis)

寄主及为害期: 黑兰、百合、凤尾兰、朱顶红、苏铁、花叶万年青、金桔、柚、花叶竹芋、山茶, 全年均可为害。

分布: 桂林雁山。

42、樟白轮盾蚧 *Aulacaspis yabuonnikkei* Kuwana

寄主及为害期: 樟、阴香、新木姜子, 全年均可为害

分布: 桂林雁山。

43、拟刺白轮蚧 *Aulacaspis pseudospinosa* Chen

寄主及为害期: 黑兰、棕榈、楠木、菝葜, 全年均可为害。

分布: 桂林雁山。

44、山茶片盾蚧 *Parlatoria camilliae* Comst.

寄主及为害期: 竹柏、山茶、杜鹃、樟、茉莉, 4—12月。

分布: 桂林雁山。

45、紫牡蛎蚧 *Lepidosaphes beckii* Newm.

寄主及为害期: 棕榈、橙、葡萄, 4—11月。

分布: 桂林雁山。

## (十七) 蚜科 Aphididae

46、芒果声蚜 *Toxoptera odina* (von der Goot)

寄主及为害期: 酸枣、盐肤木、乌桕、海桐、重阳木、梧桐、樱花、玉叶金花。3—5月。

分布: 桂林雁山。

47、桔二盆声蚜 *Toxoptera aurantii* (Boyer de Fonscolombe)

寄主及为害期: 金花茶、八角、柑桔。3—5月。

分布: 桂林雁山。

48、桔声蚜 *Toxoptera citricidus* Kirkaldy

寄主及为害期: 柑桔类。3—11月。

分布: 桂林雁山

49、粉毛蚜 *Pterocomma* sp.

寄主及为害期: 黄枝油杉。7—8月。

分布: 桂林雁山。

50、绣线菊蚜 *Aphis citricola* (Von der Goot)

寄主及为害期: 多种绣线菊、樱花、麻叶绣球、海棠、山楂、石楠、罗汉果。3—7月。

分布: 桂林雁山。

51、棉蚜 *Aphis gossypii* Glover

寄主及为害期: 柳、枫、梧桐、木槿、花椒、柑桔、罗汉果。4—10月。

分布: 桂林雁山、永福。

## (十八) 木虱科 Psyllidae

52、梧桐木虱 *Thysanogyna limdata* Endderlein

寄主及为害期: 梧桐。5—11月。

分布: 桂林雁山。

53、柑桔木虱 *Diaphorina citri* Kuwayama

寄主及为害期: 柑桔类。4—11月。

分布: 桂林雁山、灵川、临桂、柳州、南宁、玉林、博白、陆川、北流、柳城。

54、新厚毛木虱 *Caenohomotoma* sp.

寄主及为害期: 小叶榕。3—10月。

分布: 阳朔。

## 四、半翅目 Hemiptera

## (十九) 蝽科 Pentatomidae

55、紫蓝丽盾蝽 *Chrysocoris stolii* (Wolff)

寄主及为害期: 九节木属、算盘子、罗汉果。6—9月。

分布: 桂林雁山、临桂、阳朔、罗城、永福、金秀、上思、龙州、武鸣。

56、梭蝽 *Rhynchocoris humeralis* (Thunberg)

寄主及为害期: 柑桔、柚、梨。6—11月。

分布: 桂林雁山。

57、无刺瓜蚜 *Megamerum inerm* (Herrich-Schaeffer)

寄主及为害期: 罗汉果及瓜类。7-9月。

分布: 桂林雁山、博白、南宁、金秀、龙州、凭祥。

58、二星蚜 *Stollia guttiger* (Thunberg)

寄主及为害期: 红根草。7-10月。

分布: 桂林雁山、阳朔、龙胜、龙州。

59、麻皮蚜 *Erthesina fullo* (Thunb.)

寄主及为害期: 梧桐、杨柳、猕猴桃、罗汉果、柑桔、桃、梨、桑。3-10月

分布: 桂林雁山、临桂、桂平、博白。

60、点斑稻绿蚜 *Nezara viridula formu aurantiaca* Costcu

寄主及为害期: 泡桐、桂花、罗汉果。4-9月。

分布: 桂林雁山、临桂、金秀、桂平。

61、稻绿蚜 *Nezara viridula forma typica* (Linnaeus)

寄主及为害期: 泡桐、桂花、罗汉果。4-9月。

分布: 桂林雁山、临桂、龙胜、柳州、宁明、邕宁、桂平、博白。

62、茶翅蚜 *Halyomorpha picus* (Fabricius)

寄主及为害期: 豆科植物、梨、罗汉果。3-9月。

分布: 桂林雁山、龙胜、龙州、凭祥。

## (二十) 缘蚜科 Coreidae

63、黄胫侏缘蚜 *Mictis serina* Dallas

寄主及为害期: 金花茶。7-8月。

分布: 桂林雁山、龙胜。

64、瘤缘蚜 *Acanthocoris scaber* (Linnaeus)

寄主及为害期: 罗汉果及旋花科植物。5-9月。

分布: 桂林雁山、龙胜。

65、大竹缘蚜 *Notobitus excellens* Distant

寄主及为害期: 吊丝竹、勒竹、篙竹。4-9月。

分布: 桂林雁山、金秀、龙州。

66、黑须棘缘蚜 *Cletus punctulatus* Westwood

寄主及为害期: 蓼科、禾本科植物及罗汉果。5-6月。

分布: 桂林雁山。

## 五、鞘翅目 Coleoptera

## (二十一) 芜菁科 Meloidae

67、大斑芜菁 *Mylabris phalerata pallas*

寄主及为害期: 泡桐及豆科植物。5-9月。

分布: 广西各地。

68、眼斑芜菁 *Mylabris cichorii* Linn.

寄主及为害期: 泡桐、芭蕉、豆科植物。5—9月。

分布: 广西各地。

(二十二) 瓢甲科 *Coccinellidae*

69、瓢虫 *Lemnia (Lemnia) biplagiata* (Swartz)

寄主及为害期: 罗汉果。8—9月。

分布: 桂林雁山、博白。

(二十三) 鳃角金龟甲科 *Melolonthidae*

70、筛阿鳃金龟 *Apogonia cribricollis* Burmeister

寄主及为害期: 乌桕、猕猴桃、油桐。4—5月。

分布: 桂林雁山。

(二十四) 丽金龟科 *Rutelidae*

71、蓝绿丽金龟 *Popillia nutans* Newmann

寄主及为害期: 红豆树、枫香、白栎、油茶、罗汉果。5—6月。

分布: 桂林雁山。

72、相黑丽金龟 *Anomala antiqua* Gyllenhal

寄主及为害期: 泡桐、罗汉果。6—7月。

分布: 桂林雁山。

73、中喙丽金龟 *Adoretus sinicus* Burmeister

寄主及为害期: 玫瑰花、梧桐、杨、柿、桑、茶、葡萄、罗汉果。5—6月。

分布: 桂林雁山。

(二十五) 花金龟科 *Cetoniidae*

74、小青花金龟 *Oxyetonia jucunda* (Faldermann)

寄主及为害期: 银杏。6—8月。

分布: 桂林雁山、兴安。

75、白星花金龟 *Potosia brevitarsis* Lewis

寄主及为害期: 红豆树、木槿、月季、苦楝、麻栎、油茶、罗汉果。6—7月。

分布: 桂林雁山。

(二十六) 独角仙科 *Dynastidae*

76、叉尾犀金龟 *Dynastes gideon* Linnaeus

寄主及为害期: 银杏、柑桔、罗汉果。7—8月。

分布: 桂林雁山、博白、桂平。

(二十七) 天牛科 *Cerambycidae*

77、星天牛 *Anoplophara chinensis* Forster

寄主及为害期: 苦楝、相思树、樟树、乌桕、核桃、杨、柳、桑、梧桐、刺槐、悬铃木、木麻黄、柑桔。6月至翌年2月。

分布: 广西各地。

78、云斑天牛 *Batocera lineolata* Chevrolat

寄主及为害期: 桃树、泡桐、女贞、柳、板栗、栎、乌桕、榕、木荷、枫杨、水青冈、桑、油桐。全年均能为害。

分布: 桂林雁山、龙州。

- 79、桃红颈天牛 *Aromia bungii* Faldermann  
寄主及为害期: 桃树、稠李、柳、杨、栎、核桃、柿。7—12月。  
分布: 桂林雁山、临桂、灵川。
- 80、龟背天牛 *Aristobia testudo* (Voet)  
寄主及为害期: 番荔枝、双翼豆、厚壳木。4—11月。  
分布: 桂林雁山。
- 81、樟红天牛 *Eupromus ruber* (Daslman)  
寄主及为害期: 樟树、楠木。4—11月。  
分布: 桂林雁山、灵川、临桂。
- 82、瓜藤天牛 *Apomecyna saltator* Fabricius  
寄主及为害期: 柑桔及葫芦科植物。4—11月。  
分布: 桂林雁山、全州、龙胜、灌阳、临桂、永福、阳朔、蒙山、富川、钟山、藤县、贺县、岑溪、苍梧、桂平、玉林、博白、上林。
- 83、锯天牛 *Prionus insularis* Motsch.  
寄主及为害期: 柳杉、松、榆、水青冈。7—12月。  
分布: 桂林雁山、博白。
- 84、褐天牛 *Nadzhdiella cantori* Hope  
寄主及为害期: 柑桔、柚子。7—12月。  
分布: 广西各地。
- 85、光盾绿天牛 *Chelidonium argentatum* (Dalman)  
寄主及为害期: 桃树、柑桔。6月至翌年4月。  
分布: 桂林雁山、梧州。
- 86、竹丝天牛 *Purpuricenus temminckii* Guerin—Meneyille  
寄主及为害期: 毛竹、吊丝竹、枣树。6—11月。  
分布: 桂林雁山、灵川、临桂、永福。
- 87、苎麻天牛 *Paraglenea fortunei* (Saunders)  
寄主及为害期: 木槿、桑树、桂花。3—11月。  
分布: 桂林雁山、临桂、阳朔。
- 88、竹虎天牛 *Chlorophorus annularis* (F.)  
寄主及为害期: 毛竹、浦竹、枫香、柚木。6—12月。  
分布: 桂林雁山、灵川、临桂、永福。
- 89、合欢双条天牛 *Xystrocera globosa* (Oliv.)  
寄主及为害期: 合欢、槐树、桑树、木棉、楹树。6—11月。  
分布: 桂林雁山、灵川、临桂、龙州。
- 90、黄荆眼天牛 *Astahes episcopalis* Chevrolat  
寄主及为害期: 黄荆条。7—12月。  
分布: 桂林雁山、灵川、阳朔。
- 91、石梓蓑天牛 *Xyiorhiza adudta* (Wiedemann)  
寄主及为害期: 大叶紫株、海南石梓。4—6月。  
分布: 桂林阳朔、桂平。

(二十八) 萤叶甲科 *Galerucidae*92、黄守瓜 *Aulacophora femoralis* Motschlsky

寄主及为害期: 桃树、猕猴桃、桔、枣树及葫芦科植物。3—10月。

分布: 桂林雁山、临桂、永福、桂平、博白。

93、黄胫黑守瓜 *Aulacophora cattigarensis* Weise

寄主及为害期: 葫芦科植物。4—10月。

分布: 广西各地。

94、二黑条萤叶甲 *Monolepta hieroglyphis* Motschlsky

寄主及为害期: 葫芦科植物。6—8月。

分布: 桂林雁山、永福、融安。

(二十九) 象甲科 *Curculionidae*95、褐斑圆筒象 *Macrocorynus plumbeus* Formanek

寄主及为害期: 金花茶、桂花、柑桔、罗汉果。5—6月。

分布: 桂林雁山、临桂。

96、大缘象甲 *Hypomeces squamosus* Fabricus

寄主及为害期: 金花茶、甜茶、猕猴桃、柑桔、枣、盐肤木、罗汉果、红根草。4—10月。

分布: 桂林雁山、临桂、永福。

97、小绿象甲 *Platymycterus mandarinus* Fairmaire

寄主及为害期: 桂花、茶辣、猴桃、枣、柑桔、甜茶、盐肤木。5—7月。

分布: 桂林雁山、临桂。

98、竹直锥大象甲 *Cyrtotrachelus longimanus* Fabricius

寄主及为害期: 青皮竹、撑篙竹、粉单竹。3—9月。

分布: 桂林雁山、桂平、博白。

(三十) 短喙象甲科 *Brachyrhinidae*99、广西灰象 *Sympiezomias guangxiensis* Chao

寄主及为害期: 金花茶、桂花、猕猴桃、泡桐、火力楠、黄檀、三华李、乌柏、荷木、樟、柑橙类、茶辣、冬青、臭牡丹、千里光、罗汉果及蔷薇科植物。4—10月。

分布: 桂林雁山、兴安、龙胜、临桂、永福、阳朔、平乐、贺县、融水、融安、横县、灵山、扶绥、乐业、隆安、龙州。

100、毛米象 *Desmidophorus babes* Fadr.

寄主及为害期: 木芙蓉、梧桐。7—12月。

分布: 桂林雁山。

101、山茶象 *Curculio chinensis* Chevrolat

寄主及为害期: 金花茶、油茶。8月至翌年6月。

分布: 桂林雁山、全州、兴安、龙胜、资源、灵川、临桂、荔浦、恭城、鹿寨、融水、三江、融安、柳州、贵县、平南、北流、容县、玉林、横县、昭平、南丹、东兰、田林、那坡、隆林。

六、双翅目 *Diptera*

## (三十一) 实蝇科 Trypetidae

102、罗汉果实蝇 *Zeugodius caudatus* (Fabricius)

寄主及为害期: 葫芦科植物。5-10月。

分布: 桂林雁山、全州、临桂、龙胜、永福、桂平、玉林、博白。

## 七、鳞翅目 Lepidoptera

## (三十二) 蛴螬蛾科 Hepialidae

△ 103、疖蛴蛾 *Phassua nodus* Chu et Wang

寄主及为害期: 小叶女贞。11月至翌年7月。

分布: 桂林雁山。

## (三十三) 透翅蛾科 Aegeriidae

104、瓜萎透翅蛾 *Melittia bombylifomis* Cramer

寄主及为害期: 木鳖子、瓜萎。6-10月

分布: 桂林雁山。

## (三十四) 潜蛾科 Lyonetiidae

105、桔潜蛾 *Phyllocnistis citrella* stainton

寄主及为害期: 柑桔、橙子。4-12月。

分布: 广西各地。

## (三十五) 蠹蛾科

106、闪蓝斑蠹蛾 *Yleutes mineus* Cramer

寄主及为害期: 不详。成虫于6月出现。

分布: 桂林雁山。

107、六星黑点蠹蛾 *Zeuzera leuconotum* Butler

寄主及为害期: 桂花、银杏、阔叶十大功劳、栎、桦、枫、梨、茶。4月。

分布: 桂林雁山。

108、咖啡黑点蠹蛾 *Zeuzera coffeae* Nietner

寄主及为害期: 金花茶、白杨、黄杨、蝴蝶果、板栗、香椿、乌柏。4-6月。

分布: 桂林雁山、融安、柳江、武宣、平南、玉林、巴马、凭祥。

## (三十六) 蓑蛾科 Psychidae

109、茶袋蛾 *Clania minuscula* Buter

寄主及为害期: 金花茶、桂花、茶、柑桔、梨、罗汉果。6-9月。

分布: 广西各地。

## (三十七) 斑蛾科 Zygaenidae

110、绿脉锦斑蛾 *Chaicosia pictinicornis* aucto Linnaeus

※ 标本由中国科学院动物研究所薛大勇同志鉴定。

△ 标本由中国科学院动物研究所朱弘复教授鉴定。

▲ 标本由中国科学院动物研究所李传隆教授鉴定。

寄主及为害期: 不详。

分布: 桂林雁山。

111、茶六斑褐锦斑蛾 *Sorita pulchella sexpunctata* Walker

寄主及为害期: 金花茶。4—5月。

分布: 桂林雁山。

112、茶柄脉锦斑蛾 *Eterusia aedea* Linnaeus

寄主及为害期: 重阳木、茶、油茶。5—10月。

分布: 桂林雁山、兴安、龙胜、平乐、金秀、昭平、玉林、钦州、横县、南宁、天等。

#### (三十八) 刺蛾科 Eucleidae

113、褐刺蛾 *Thosea baibarana* Matsumura

寄主及为害期: 芭蕉、柑桔、桑、棕竹、罗汉果。6—8月。

分布: 桂林雁山。

114、迹斑刺蛾 *Parasa pastoralis* Butler

寄主及为害期: 樟、乌桕。6—8月

分布: 桂林雁山、融安、金秀。

115、褐边绿刺蛾 *Parasa consocia* Walker

寄主及为害期: 喜树、枳椇、悬铃木、柿、油茶、梨、乌桕、核桃、柳、毛竹、橄榄、台湾相思、板栗、香椿、枫香、阴香、桃、冬青。4—8月。

分布: 广西各地。

116、黄刺蛾 *Cnidocampa flavescens* (Walker)

寄主及为害期: 蔷薇、石榴、梧桐、梨、桃、梅、杏、李、柿、枣、栗、枇杷、柳、樱桃、核桃、山楂、酸枣、杨梅、枫杨、油桐、乌桕、楝、茶、桑。6—10月。

分布: 桂林雁山、资源、龙胜、临桂、永福、恭城、灌阳、荔浦、南丹、昭平、凤山、平南、桂平、藤县、容县、玉林、陆川、南宁、崇左、田阳、天等、凭祥、龙州。

#### (三十九) 草蛾科 Ethmiidae

117、江苏草蛾 *Ethmia assamensis* Butler

寄主及为害期: 厚壳木。4—10月。

分布: 桂林雁山。

118、黑顶草蛾 *Ethmia nigroapicella* (Saalmuller)

寄主及为害期: 厚壳木。4—10月。

分布: 桂林雁山。

#### (四十) 卷蛾科 Tortricidae

119、黄色卷蛾 *Choristoneura longicellana* Walsingham

寄主及为害期: 桂花、白蝉、八角、浩浩巴、梨、山楂、鼠李、栎、山槐、银杏。4—9月。

分布: 桂林雁山。

120、拟小黄卷叶蛾 *Adoxophyes cyrtosema* Meyrick

寄主及为害期: 桂花、玫瑰、柑桔。5—9月。

分布: 桂林雁山。

121、拟后黄卷叶蛾 *Cacoecia micana* var. *Comocta* Meyrick

寄主及为害期: 八角、罗汉果。4—9月。

分布: 桂林雁山、博白。

(四十一) 螟蛾科 *Pyralidae*

122、蜡螟 *Galleria mellonella* (Linnaeus)

寄主及为害期: 蜂蜡。5—6月。

分布: 桂林雁山。

123、稻巢螟 *Ancylolomia chrysographella* Kollar

寄主及为害期: 台湾草。2—12月。

分布: 桂林雁山。

124、豆荚螟 *Etiella zinckenella* Treitschke

寄主及为害期: 洋槐、扁豆、猪屎豆。4—10月。

分布: 广西各地。

125、干果斑螟 *Cadra cautella* (Walker)

寄主及为害期: 为害各种储藏干果、干菜及其加工产品。1—4月。

分布: 桂林雁山。

126、盐肤木瘤丛螟 *Orthaga euadrusalis* Walker

寄主及为害期: 盐肤木、酸枣。5—8月。

分布: 桂林雁山。

127、泡桐卷叶野螟 *Pycnarmon cribrata* Fabricius

寄主及为害期: 泡桐。8—9月。

分布: 桂林雁山。

128、棉卷叶野螟 *Sylepta derogata* Fabricius

寄主及为害期: 木芙蓉、木槿、锦葵、梧桐、汉地桃花。5—9月。

分布: 广西各地。

129、桃蛀螟 *Dichocrocis punctiferalis* Guenee

寄主及为害期: 桃、樱桃、石榴、板栗、梨、柑桔、蓖麻。4—9月。

分布: 桂林雁山、灌阳、资源、河池。

130、三条蛀野螟 *Dichocrocis chlorophanta* Butler

寄主及为害期: 栗。4—9月。

分布: 桂林雁山。

131、卷叶螟 *Sylepta* sp.

寄主及为害期: 酸枣、盐肤木。7—9月。

分布: 桂林雁山、博白。

132、瓜绢螟 *Diaphania indice* Saunders

寄主及为害期: 木槿、蒲葵、油瓜、罗汉果。6—11月。

分布: 广西各地。

133、白蜡绢野螟 *Diaphania nigropunctalis* (Bremer)

寄主及为害期: 桂花、小叶女贞、丁香、白蜡树、梧桐。5—9月。

分布: 桂林雁山。

134、茄白翅野螟 *Leucinodes orbonalis* Guenee

寄主及为害期: 龙葵、茄科植物。7—8月。

分布: 桂林雁山。

135、山梔子三纹野螟 *Archernis tropicalis* Walker

寄主及为害期: 山梔子、白蝉。6—7月。

分布: 桂林雁山。

136、竹织叶野螟 *Ooclebotys coclesaslis* (walker)

寄主及为害期: 酸枣、吊丝竹、刺竹。8—9月。

分布: 桂林雁山。

137、褐切叶野螟 *Herptogramma rudis* (walker)

寄主及为害期: 台湾草。7—8月。

分布: 桂林雁山。

#### (四十二) 枯叶蛾科 *Lasiocampidae*

138、落叶松枯叶蛾 *Paraleba plagifera* Walker

寄主及为害期: 银杏、落叶松、栎、杨。10—12月到次年3—7月。

分布: 桂林雁山。

139、马尾松毛虫 *dendrolimus punctatus* Walker

寄主及为害期: 银杉、马尾松。3—9月。

分布: 桂林雁山、全州、兴安、灵川、临桂、永福、柳州、钦州、来宾、南宁。

140、枯叶蛾 *Paralebeba* sp.

寄主及为害期: 桂花树。6—7月。

分布: 桂林。

141、栗黄枯叶蛾 *Trabala uishnou* Lefebure

寄主及为害期: 石榴、相思树、板栗、毛栗。9—10月。

分布: 桂林雁山。

#### (四十三) 大蚕蛾科 *Saturniidae* (= *Attacidae*)

142、绿尾大蚕蛾 *Actias selen ningpoana* Felder

寄主及为害期: 木槿、枫杨、海棠、樱桃、杨、柳、樟树、乌柏。4—10月。

分布: 桂林雁山、龙州。

143、大乌柏蚕 *Attacus atlas* Linnaeus

寄主及为害期: 乌柏、梅叶冬青、柳、樟、大叶合欢。6—8月。

分布: 桂林雁山。

144、樗蚕 *Philosamia cynthia* Walker et Felder

寄主及为害期: 含笑、冬青、臭椿、乌柏、八角、樟、喜树、山苍子。5—6月。

分布: 桂林雁山、全州、永福、荔浦、钟山、昭平、柳州、柳江、藤县、来宾、象州、桂平。

145、柞蚕 *Antheraea pernyi* Guerin—Meneville

寄主及为害期: 山楂、樟、板栗、柞树、栎。4—6月。

分布: 桂林雁山、桂平。

146、银杏大蚕蛾 *Dictyoploca japonica* Moore

寄主及为害期: 银杏、栗、柳、樟、泡桐、八角、李、梨。3—6月。

分布: 桂林雁山、兴安、灵川。

147、樟蚕 *Eriogyna pyretorum* Westwood

寄主及为害期: 野蔷薇、樟、枫香、番石榴、杨、板栗、梨。3—7月。

分布: 广西各地。

(四十四) 尺蛾科 *Gemetridae*

148、女贞尺蛾 *Naxa (psilonaxa) seriaria* Motschulsky

寄主及为害期: 女贞、丁香。5—7月。

分布: 桂林。

※ 149、桂花点尺蛾 *Naxa angustaria* leech

寄主及为害期: 桂花。7—8月。

分布: 桂林。

150、菊四目录尺蛾 *Euchloris albocostaria* Bremer

寄主及为害期: 菊、艾。8—9月。

分布: 桂林。

151、樟翠尺蛾 *Thalassodes quadraria* Guenee

寄主及为害期: 樟。6—7月。

分布: 桂林雁山、昭平、玉林、南宁、凭祥。

152、锯翅尺蛾 *Angerona glandinaria* Motschulsky

寄主及为害期: 李、桦、柳、忍冬。4—10月。

分布: 桂林雁山。

153、木撩尺蛾 *Culcula panterinaria* Bremer et Grey

寄主及为害期: 酸枣、臭椿、泡桐、楝、漆树、山花椒、木蓼、核桃。7—8月。

分布: 桂林雁山。

154、油桐尺蛾 *Buzura suppressaria* Guenee

寄主及为害期: 扁柏、阴香、八角、黄檀、柑桔、樟、大叶栎、荷木、油桐、茶、油茶、乌柏、漆树。4—9月。

分布: 广西各地。

155、尺蛾一种 *Buzura* sp.

寄主及为害期: 罗汉果。6—7月。

分布: 桂林雁山。

156、榛金星尺蛾 *Calospilos sylvata* Scopoli

寄主及为害期: 桤、榆、稠李、榛、山毛榉。9—10月。

分布: 桂林雁山。

157、尘尺蛾 *Serraca punctinans conferenda* Butier

寄主及为害期: 蔷薇、钩樟、栎、栗、柠檬桉。8—9月。

分布: 桂林、龙胜、南宁。

158、槐尺蛾 *Semiethisa (Macaria) cinerearia* Bremer et Grey 寄主及为害期: 国槐、刺

槐。5—6月。

分布: 桂林雁山。

※ 159、佳眼尺蛾 *Problepsis eucircota* prout

寄主及为害期: 小叶女贞。4—10月。

分布: 桂林雁山。

## (四十五)天蛾科 Sphingidae

- 160、鬼脸天蛾 *Acherontia lachesis* Fabricius  
寄主及为害期: 豆科、茄科及唇形花科植物。5—8月。  
分布: 桂林雁山。
- 161、芝麻鬼脸天蛾 *Acherontia styx* Westwood  
寄主及为害期: 豆科、茄科及唇形科植物。6—8月。  
分布: 广西各地。
- 162、白薯天蛾 *Herse cornuoludi* Linnaeus  
寄主及为害期: 旋花科植物。6—7月。  
分布: 广西各地。
- 163、桃六点天蛾 *Maschumba gaschkewitschii* Brem. et Gray  
寄主及为害期: 海棠、樱桃、梨、李、枣、枇杷、葡萄。6—11月。  
分布: 桂林、龙胜、鹿寨、南丹、巴马、凌云。
- 164、霜天蛾 *Psilogramma menephron* Cramer  
寄主及为害期: 女贞、泡桐、樟、白蜡树、梧桐。5—6月。  
分布: 桂林雁山、龙胜、临桂、鹿寨、柳州、平乐、罗城、钟山、富川、河池、南丹、环江、平南、容县、玉林、横县、南宁、合浦、平果、凭祥、乐业。
- 165、鹰翅天蛾 *Oxyambulyx ochracea* Butler  
寄主及为害期: 槭树和核桃科植物。7—8月。  
分布: 桂林、龙胜、融安、南丹、玉林、南宁、巴马、凭祥、凌云。
- 166、雀纹天蛾 *Theretra japonica* Orza  
寄主及为害期: 绣球花、葡萄、白藤、爬山虎、虎耳草。6—7月。  
分布: 桂林雁山。
- 167、芋双线天蛾 *Theretra oldenlandie* (Fabricius)  
寄主及为害期: 马蹄莲、凤仙花、黄麻、山核桃。7—8月。  
分布: 桂林雁山、环江、南宁、合浦、巴马、乐业、隆林。
- 168、线天蛾 *Theretra* sp.  
寄主及为害期: 木槿、白粉藤、葡萄。5—7月。  
分布: 桂林雁山。
- 169、咖啡透翅天蛾 *Cephonodes hylas* Linnaeus  
寄主及为害期: 白蝉。6—7月。  
分布: 桂林雁山、南宁。
- 170、小豆长喙天蛾 *Macroglossum stallatarum* Linnaeus  
寄主及为害期: 茜草科植物。6—7月。  
分布: 桂林雁山。
- △ 171、斑腹长喙天蛾 *Macroglossum variegatum* Rothschild et Jordan  
寄主及为害期: 虎皮楠。7—8月。  
分布: 桂林雁山。
- 172、星绒天蛾 *Dolbina tancrei* Staudinger  
寄主及为害期: 桂花、女贞、樟木。4—5月。

分布: 桂林雁山。

173、斜绿天蛾 *Rhyncholaba acteus* (Cramer)

寄主及为害期: 马蹄莲、秋海棠、芋属、魔芋属、海芋。5—7月。

分布: 桂林雁山。

(四十六)舟蛾科 *Notodontidae*

174、苹掌舟蛾 *Phalera flauescens* (Bremer et Grey)

寄主及为害期: 枇杷、海棠、李、梅、桃、杏、梨等。8—10月。

分布: 桂林雁山、资源、藤县、玉林。

(四十七)灯蛾科 *Arctiidae*

175、红缘灯蛾 *Amsacta lactinea* (Gramer)

寄主及为害期: 猕猴桃、罗汉果、柑桔、马甲子、桑等。3—7月。

分布: 桂林雁山、融安、都安、巴马、合浦、龙州。

176、星白灯蛾 *Spilosoma menthastri* (Esper)

寄主及为害期: 甜茶、桑、蓼、薄荷。3—4月。

分布: 桂林雁山。

177、黑条灰灯蛾 *Cretonous gangis* (Linnaeus)

寄主及为害期: 台湾草、桑、茶、柑桔。2—8月。

分布: 桂林雁山、龙胜、柳州、玉林、南宁、龙州。

178、八点灰灯蛾 *Cretonotus transiens* (Walker)

寄主及为害期: 砍头树、茶、桑、柑桔、板栗、荷木。8—9月。

分布: 桂林、龙胜、环江、柳州、横县、玉林、南宁、西林、巴马、东兰、凭祥。

179、乳白斑灯蛾 *Pericallia galactina* (Hoven)

寄主及为害期: 不详。成虫在四月中旬出现。

分布: 桂林雁山。

180、粉蝶灯蛾 *Nyctemera plagifera* Walker

寄主及为害期: 柑桔、菊科植物、无花果。4—5月。

分布: 桂林雁山。

181、玫腹灯蛾 *Rhodogastria astreus* (Drury)

寄主及为害期: 清明花属植物。为害期不详。

分布: 桂林雁山。

(四十八)毒蛾科 *Lymantriidae*

182、白毒蛾 *Arctornis alba* (Bremer)

寄主及为害期: 茶、油茶。2—11月。

分布: 桂林雁山、柳州。

183、豆毒蛾 *Cifuna locuples* Walker

寄主及为害期: 玫瑰、火石榴。7—8月。

分布: 桂林雁山。

184、黑衣黄毒蛾 *Euproctis karosawai* Inoue

寄主及为害期: 紫薇、刺槐。5—11月。

分布: 桂林、南宁、龙州。

185、漆腹黄毒蛾 *Euproctis montis* Leech

寄主及为害期: 枇杷。5—7月。

分布: 桂林雁山。

186、茶毒蛾 *Euproctis pseudoconspersa* Strand

寄主及为害期: 柑桔、柿、油桐、油茶、茶。3—9月。

分布: 广西各地。

187、黄毒蛾 *Euproctis* sp.

寄主及为害期: 火力楠。7—8月。

分布: 桂林雁山。

188、黄毒蛾 *Euproctis* sp.

寄主及为害期: 桂花。5月。

分布: 桂林雁山。

189、红缘舞毒蛾 *ocneria uiola* Swinhoe

寄主及为害期: 壳斗科植物。6—7月。

分布: 桂林雁山。

## (四十九)夜蛾科 Noctuidae

190、果剑纹夜蛾 *Acronyeta strigosa* (Schifferrmuller)

寄主及为害期: 樱桃、山楂、桃、梨、杏、李、梅。6—9月。

分布: 桂林雁山。

191、三齿剑纹夜蛾 *Acronyeta tridens* (Schifferrmuller)

寄主及为害期: 罗汉果。3—9月。

分布: 桂林雁山。

192、桃剑纹夜蛾 *Acronyeta increta* Butler

寄主及为害期: 樱桃、杏、梅、李、柳、桃、梨。3—10月。

分布: 桂林雁山。

193、斜纹夜蛾 *Prodenia litura* Fabricius

寄主及为害期: 银杏、柳杉、桑、茶、漆。3—12月。

分布: 桂林雁山、玉林、南宁、凭祥。

194、淡剑夜蛾 *Sidemia deprauata* (Butler)

寄主及为害期: 台湾草。2—12月。

分布: 桂林雁山。

195、小地老虎 *Agrotis ypsilon* (Rottemberg)

寄主及为害期: 猕猴桃、罗汉果。4—10月。

分布: 广西各地。

196、焦条丽夜蛾 *Acontia graellsii* Feisthamel

寄主及为害期: 木芙蓉、花葵、汉地桃花。5—9月。

分布: 桂林雁山、融安、巴马、容县、凭祥。

197、臭椿皮蛾 *Elingma narcissus* (Cramer)

寄主及为害期: 臭椿、羊蹄甲。4—7月。

分布: 桂林雁山、兴安、柳州、柳江、来宾、平南、玉林、南宁、钦州、合浦、乐业。

198、细皮夜蛾 *Selepa celtir* Moore

寄主及为害期: 枇杷。4—9月。

分布: 桂林雁山、全州、灌阳、灵川、临桂、永福、恭城、蒙山、融安、象州、武宣、柳城、罗城、苍梧、南宁。

199、柿瘿皮蛾 *Blenina senex* (Butler)

寄主及为害期: 柿树。2—9月。

分布: 桂林雁山、玉林。

200、银纹夜蛾 *Plusia agnata* Staudinger

寄主及为害期: 菊花、竹类、豆类及十字科植物。7—8月。

分布: 桂林雁山、金秀、玉林、南宁、凭祥、东兰、乐业。

201、纹夜蛾 *Plusia* sp.

寄主及为害期: 十字花科植物。5—6月。

分布: 桂林雁山。

202、连纹夜蛾 *Plusia crassigna* (Warren)

寄主及为害期: 菊花、杨、蓖麻。7—8月。

分布: 桂林雁山。

203、葫芦夜蛾 *Plusia peponis* (Fabricius)

寄主及为害期: 罗汉果等葫芦科植物。5—7月。

分布: 桂林、资源、永福、南宁。

204、旋目夜蛾 *Speirtonia retorta* (Linnaeus)

寄主及为害期: 合欢。6—7月。

分布: 桂林雁山。

205、变色夜蛾 *Enmonodia vespertilio* (Fabricius)

寄主及为害期: 榿树、藤。8—9月。

分布: 桂林、南宁。

206、青安纽夜蛾 *Anua tihaca* (Cramer)

寄主及为害期: 石榴、酸枣、乳香、漆树、盐肤木、柑桔。6—9月。

分布: 桂林雁山、隆安、玉林、乐业。

207、中带三角夜蛾 *Chalciope geometrica* (Fabricius)

寄主及为害期: 石榴、柑桔、金雀儿、乌桕、悬钩子、蓖麻。4—9月。

分布: 桂林雁山、融水、贵县、平南、南宁、合浦、凭祥。

208、短带三角夜蛾 *Chalciope byppasia* (Cramer)

寄主及为害期: 三叶豆。9月。

分布: 桂林、南宁、凭祥。

209、飞扬阿夜蛾 *Achaea melicerta* (Drury)

寄主及为害期: 蓖麻、飞扬草。4—11月。

分布: 桂林雁山。

210、石榴巾夜蛾 *Parallelia Stupsa* (Fabricius)

寄主及为害期: 石榴、乌桕。4—7月。

分布: 桂林雁山、玉林、合浦、南宁、崇左、龙州。

211、玫瑰巾夜蛾 *Parallelia arctaenia* (Guenee)

寄主及为害期: 玫瑰、蓖麻。7—8月。

分布: 桂林雁山、融水、柳州、柳江、南宁、龙州、乐业。

212、桥夜蛾 *Anomis mesogona* Walker

寄主及为害期: 红悬钩、醋栗。4—5月。

分布: 桂林雁山。

213、小造桥虫 *Anomis flou* (Fabricius)

寄主及为害期: 木槿、蜀葵。8—9月。

分布: 广西各地。

214、涂闪夜蛾 *Sypna picta* Butler

寄主及为害期: 悬钩子、绞股蓝。8—9月。

分布: 桂林雁山。

215、苹梢鹰夜蛾 *Hypocala moorei* Butler

寄主及为害期: 柿、栎类。4—11月。

分布: 桂林雁山、三江、金秀、鹿寨、柳州、忻城、富川、横县、浦北、合浦、龙州、凭祥。

(五十) 虎蛾科 *Agaristidae*216、彩虎蛾 *Eusemia anctopsa* Chu et Chen

寄主及为害期: 参薯。5—10月。

分布: 桂林雁山。

217、虎蛾 *Seudyra* sp.

寄主及为害期: 葡萄、爬山虎。4—5月。

分布: 桂林雁山。

(五十一) 弄蝶科 *Hesperiidae*218、芭蕉弄蝶 *Erionota thorax* Linnaeus

寄主及为害期: 芭蕉、香蕉、花蕉。6—11月。

分布: 广西各地。

(五十二) 蛱蝶科 *Nymphalidae*219、琉璃蛱蝶 *Kaniska canace* Linnaeus

寄主及为害期: 百合、拔葵。7—8月。

分布: 桂林雁山。

220、美目蛱蝶 *Precis abmana* Linnaeus

寄主及为害期: 靛蓝、芦莉草及爵床科植物。7—8月。

分布: 桂林雁山。

221、黑脉蛱蝶 *Hestina assimilis* Linnaeus

寄主及为害期: 朴树。4—7月。

分布: 桂林雁山、柳州。

222、鹅绒蛱蝶 *Precis iphita* Cramer

寄主及为害期: 不详。

分布: 桂林雁山。

223、木叶蛱蝶 *Kallima Chinsis* Swinhoe

寄主及为害期: 马蓝、蓼。6—7月。

分布: 桂林雁山。

224、茶褐樟蛱蝶 *Charaxes polyxena* Cramer

寄主及为害期: 樟、阴香。7—12月。

分布: 桂林。

225、链环蛱蝶 *Neptis pryeri* Butler

寄主及为害期: 绣线菊属植物。7—8月。

分布: 桂林雁山。

226、中环蛱蝶 *Neptis hylas* Linnaeus

寄主及为害期: 胡枝子等豆科植物。7—8月。

分布: 桂林雁山。

227、大豹蛱蝶 *Chikdrana chilbreni* Gray

寄主及为害期: 不详。

分布: 桂林雁山。

228、裴豹蛱蝶 *Argyreus hyperbius* Linnaeus

寄主及为害期: 紫花地丁等槿科植物。7—9月。

分布: 桂林、融水、南丹、岑溪、崇左。

229、金鱼草蛱蝶 *Precis orthya* Linnaeus

寄主及为害期: 不详。

分布: 桂林、鹿寨、南宁、扶绥。

230、蓖麻蛱蝶 *Ariadne ariadne* Linnaeus

寄主及为害期: 蓖麻。6—8月。

分布: 桂林。

▲ 231、桂花蛱蝶 *Kironga ranga* Moore

寄主及为害期: 桂花。3—4月。

分布: 桂林雁山。

▲ 232、算盘子蛱蝶 *Athyna perius* Linnaeus

寄主及为害期: 算盘子。6—8月。

分布: 桂林雁山。

(五十三) 灰蝶科 *Lycaenidae*

233、二尾灰蝶 *Aphnaeus syama forsana* Moore

寄主及为害期: 不详。

分布: 桂林雁山。

234、琉璃灰蝶 *Celastina argious* Linnaeus

寄主及为害期: 葛藤、紫藤、苦参、冬青、胡枝子。5—6月。

分布: 桂林雁山。

235、苏铁小灰蝶 *Polymmatas* sp.

寄主及为害期: 苏铁、叉叶苏铁、蓖齿苏铁、神仙来。6—8月。

分布: 桂林雁山。

(五十三) 斑蝶科 *Danaidae*

236、花纹斑蝶 *Danaus plexippus* Linnaeus

寄主及为害期: 不详。成虫于7—8月出现。

分布: 桂林雁山。

237、斯氏黑斑蝶 *Danaus melaneus Swinhoei* Moore

寄主及为害期: 不详。成虫于5—6月出现。

分布: 桂林雁山。

#### (五十四)粉蝶科 Pieridae

238、十大功劳黑脉粉蝶 *Cepora coronis* Cramer

寄主及为害期: 阔叶十大功劳。11—3月。

分布: 桂林雁山、岑溪、东兰、宁明。

239、东方粉蝶 *Pieris caridia* Sparmann

寄主及为害期: 决明、及十字花科植物。3—10月。

分布: 广西各地。

240、黑脉粉蝶 *Pieris melete* Menetries

寄主及为害期: 十字花科植物。4—5月。

分布: 桂林雁山。

241、宽边黄粉蝶 *Eurema hecabe* Linnaeus

寄主及为害期: 胡枝子、合欢、云实、山扁豆、皂荚。5—8月。

分布: 桂林雁山。

#### (五十五)凤蝶科 Papilionidae

242、柑桔凤蝶 *Papilio xuthus* Linnaeus

寄主及为害期: 柑橙类、花椒、阴香。3—10月。

分布: 广西各地。

243、无尾墨凤蝶 *Papilio memnon thunbergii* von Siebold

寄主及为害期: 柑桔类。4—8月。

分布: 桂林雁山、宁明、龙州、凭祥。

244、玉带凤蝶 *Papilio polytes* Linnaeus

寄主及为害期: 柑桔、枳壳。4—10月。

分布: 桂林、融安、柳江、钟山、蒙山、贺县、昭平、苍梧、藤县、钦州、南宁、凭祥。

245、蓝凤蝶 *Papilio protenor* Cramer

寄主及为害期: 泡桐、八角、柑桔、山花椒。5—9月。

分布: 桂林、金秀、环江、南宁、宁明、龙州。

246、马兜铃凤蝶 *Sericinus telamon* Donovan

寄主及为害期: 马兜铃、青香木。5—10月。

分布: 桂林雁山。

247、樟青凤蝶 *Graphium sarpedon* Linnaeus

寄主及为害期: 阴香、樟、楠木、八角、梧桐、玉桂。3—11月。

分布: 桂林、平乐、南丹、三江、柳州、横县、浦北、南宁、邕宁、扶绥、上林、武鸣、都安、龙州、凭祥、百色。

248、碧凤蝶 *Papilio bianor* Cramer

寄主及为害期: 柑桔、黄蘗、山椒。5—6月。

分布: 桂林雁山。

## 八、膜翅目 Hymenoptera

### (五十六) 叶蜂科 Tenthredinidae

249、樟叶蜂 *Mesoneura rufonota*

寄主及为害期: 樟树。4—6月。

分布: 桂林雁山。

250、绣线菊叶蜂 *Mesoneura* sp.

寄主及为害期: 绣线菊。4—7月。

分布: 桂林雁山。

251、桂花叶蜂 *Tomostethus* sp.

寄主及为害期: 桂花、四季桂、丹桂。2—4月。

分布: 桂林。

### (五十七) 三叶蜂科 Argidae

252、杜鹃叶蜂 *Arge similis* Vollenhoven

寄主及为害期: 映山红、杜鹃。4—6月。

分布: 桂林雁山。

253、月季叶蜂 *Arge* sp.

寄主及为害期: 月季、玫瑰。3—10月。

分布: 桂林雁山。

254、玫瑰叶蜂 *Arge* sp.

寄主及为害期: 玫瑰、小果蔷薇。5—9月。

分布: 桂林雁山。

### (五十八) 瘿蜂科 Cynipidae

255、栗瘿蜂 *Dryocosmus kuriphilus* Yasurnatus

寄主及为害期: 板栗。3—5月。

分布: 桂林雁山、柳州、宜山、环江、融安、融水、三江、柳江、柳城、忻城、来宾、横县、都安、南丹、玉林、容县、隆安、大新、贺县、昭平。

### 主要参考文献

- 1、夏宝池,等. 花卉病虫害及防治. 江苏科技出版社出版 1985
- 2、苏星,等. 花木病虫害防治. 广东科技出版社出版 1985
- 3、广西农业厅等. 广西农作物病虫害名录. 广西人民出版社出版 1964
- 4、杨秀元,等. 中国森林昆虫名录. 中国林业出版社出版 1981
- 5、朱弘复,等. 蛾类图册(2). 科学出版社出版 1980
- 6、黎天山,等. 罗汉果名录初报. 广西植物 4(2) 5(3) 1984-85

7. 黎天山、等。桂花叶蜂生物学及防治。广西植物 6(4) 1986

8. 牟甲佑、等。常见昆虫图 册第一册。湖南省彬州地区林业局 湖南省彬州地区林业科学研究所。

## A PRELIMINARY STUDY ON THE INSECT PESTS OF GARDENS, YANSHAN, GUILIN, GUANGXI

Li Tian-shan

( Guangxi Institute of Botany )